


# + PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE URGENCIA

**INTOXICACIÓN  
POR RATICIDAS  
ANTICOAGULANTES**



## + DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS RATICIDAS

- Los distintos principios activos de los raticidas anticoagulantes tienen potencias y tiempos de duración de la actividad en el cuerpo diferentes
- Saber si se ha ingerido una dosis tóxica y cuál es el principio activo permite decidir qué intervenciones pueden ser necesarias y durante cuánto tiempo se deben tratar los casos sintomáticos (algunos pueden durar hasta 8 semanas)
  - o Ponerse en contacto con el Servicio de información Toxicología (SIT) en el 91 562 04 20 para obtener asesoramiento si es necesario
  - o Si no se dispone de la ficha técnica del principio activo, es posible enviar una muestra del tóxico, de sangre o de vómito al SIT para identificar la toxina
- Los síntomas de la intoxicación por raticida anticoagulante suelen aparecer entre 5 y 7 días después de la ingestión y pueden ser amplios y variados según el lugar donde se produzca el sangrado
- El aumento de únicamente el TP, o un aumento desproporcionadamente elevado en comparación con el TTPa, es muy indicativo de intoxicación por raticida anticoagulante
- ¡El TP es su guía! Úselo para adaptar el plan de tratamiento
- No todos los raticidas son anticoagulantes, p. ej., el raticida de colecalciferol causa hipercalcemia

## + PRODUCTOS

### VITAMINA K1 INYECTABLE

- 50 mg por vial de 5 ml
- Autorizado para uso intravenoso a 5 mg/kg
- Recuerde inyectarla MUY lentamente.
- 1 vial por cada 10 kg o 0,5 ml/kg
- Caja con 6 viales



### FICHA TÉCNICA VITAMINA K1



### VITAMINA K1 50 MG COMPRIMIDOS

- 50 mg por comprimido
- Ranurados para poderlos dividir en cuartos
- Autorizado para uso oral a 5 mg/kg una vez al día
- Administrar con alimentos ricos en grasas
- 1 comprimido por cada 10 kg al día
- Caja con 14 comprimidos



### FICHA TÉCNICA EMEDOG



### EMEDOG

- El emético veterinario autorizado de apomorfina para inducir el vómito en el perro
- 0,1 ml/kg (0,1 mg/kg).
- Inyección subcutánea
- El vómito se produce rápidamente.
- Vial de 1 ml (1 vial por cada 10 kg).
- Dosificar siempre según las pautas autorizadas



### FICHA TÉCNICA CARBODOTE



### CARBODOTE PRIME Y REPEAT

- Preparados listos para usar con superior adsorbencia
- Carbodote está disponible en un dúo único de jeringas precargadas de carbón activado: **Carbodote Prime** (carbón activado mas sulfato sódico catártico) y **Carbodote Repeat** (carbón activado)



THE **ANTI-TOX** RANGE  
BE PREPARED FOR POISONING

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA ANTI-TOX DE TVM, VISITE [HTTPS://TVMANIMALHEALTH.ES/](https://tvmanimalhealth.es/)

**tvm**