

+ PAUTA POSOLÓGICA DE EMEDOG

EMÉTICO VETERINARIO DE APOMORFINA
PARA INDUCIR EL VÓMITO EN EL PERRO



TAMAÑO Y CONCENTRACIÓN DEL VIAL FORMULADO PARA GARANTIZAR UNA DOSIFICACIÓN FÁCIL Y PRECISA PARA EL PACIENTE CON UN DESPERDICIO MÍNIMO.

- Las cajas contienen viales de 1 ml
- Inyección subcutánea
- 1 mg de apomorfina por ml

0,1 ml/kg o 1 vial por cada 10 kg



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Peso (kg) | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Dosis de Emedog (ml) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |

Consulte nuestras pautas posológicas paso a paso y otros recursos útiles en www.domespharma.es