

THE EPILEP3Y SYSTEM

TU GUÍA
EN EL MANEJO DE
LA EPILEPSIA

GAMA DE
PRODUCTOS

SOPORTE
TÉCNICO

THE EPILEP3Y SYSTEM SOPORTE TÉCNICO

Principales medicamentos usados en el tratamiento de la epilepsia.

PARA EL TRATAMIENTO A CORTO PLAZO DE LAS CONVULSIONES

DIAZEPAM

5 MG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN

Para el tratamiento a corto plazo de trastornos convulsivos y espasmos musculares de origen central y periférico o como parte de un protocolo preanestésico o de sedación.

- Caja con 6 viales de 2 ml.
- Período de validez del medicamento envasado para la venta: 4 años.
- Especies de destino: perros y gatos.



PARA USO EN MONOTERAPIA O COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE

BROMURO POTÁSICO

EL ÚNICO BROMURO DE POTASIO PARA SU USO YA SEA EN MONOTERAPIA O EN COMBINACIÓN CON FENOBARBITAL

Un agente antiepiléptico para su uso en el control de las crisis epilépticas idiopáticas, como agente único o como complemento al fenobarbital en el control de casos refractarios de epilepsia idiopática.

- Caja con 60 comprimidos (4 blísteres de 15 comprimidos).
- Período de validez del medicamento envasado para la venta: 4 años.
- Régimen de dosificación:
Dosis inicial para monoterapia: 30mg/kg de peso corporal dos veces al día.
Dosis inicial para terapia adjunta: 15mg/kg de peso corporal dos veces al día.
- Especies de destino: perros.



TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

FENOBARBITAL

3 DOSIFICACIONES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD

PREVENCIÓN DE LAS CRISIS DE EPILEPSIA GENERALIZADA EN PERROS.

- Cajas con 60 comprimidos (5 blísteres de 12 comprimidos).
- Régimen de dosificación:
Dosis inicial 2-5 mg/kg de peso corporal/día*.
- Período de validez del medicamento envasado para la venta: 30 meses para Soliphen 15 mg y 3 años para Soliphen 60mg y 120mg.
- Especies de destino: perros.

El fenobarbital es el tratamiento de primera línea para la epilepsia idiopática, según la IVETF.¹

La dosis inicial es de 5mg/kg/día dividida en dos dosis administradas con 12 horas de intervalo, con el objetivo de alcanzar concentraciones séricas séricas entre 25-35mg/L.²



Ziapam®	CANTIDAD DE PRINCIPIO ACTIVO (DIAZEPAM)	CANTIDAD DE ZIAPAM	TRATAMIENTO DE UNA AMPOLLA DE ZIAPAM POR PESO DEL ANIMAL
MANEJO DE TRASTORNOS CONVULSIVOS A CORTO PLAZO	0,5 mg/kg peso corporal	0.5 ml/5 kg	20 kg
	Administrado en bolo (inyección intravenosa lenta) y repetida hasta tres veces, después de no menos de 10 minutos cada vez.		
MANEJO DE ESPASMOS MUSCULOESQUELÉTICOS A CORTO PLAZO	0,5-2 mg/kg peso corporal	0.5-2 ml/5 kg	5 kg - 20 kg
COMO PARTE DE UN PROTOCOLO DE SEDACIÓN	0,2-0,6 mg/kg peso corporal	0.2-0.6 ml/5 kg	16 kg - 50 kg
COMO PARTE DE UN PROTOCOLO PRE-ANESTÉSICO	0,2-0,6 mg/kg peso corporal	0,2-0,6ml/kg	≥ 50 kg

Vetbromide®

600 mg de bromuro potásico en comprimido doble divisible



60 MG/KG/DÍA COMO DOSIS INICIAL EN MONOTERAPIA*.



1/2 COMPRIMIDO MAÑANA Y NOCHE** PARA UN PERRO DE 10 KG

En estas condiciones, una caja de 60 comprimidos dura 2 meses.

Concentración sérica en estado estacionario alcanzada después de 2 a 3 meses de terapia de mantenimiento



Soliphen® 15mg

15 mg de fenobarbital en un comprimido** individual divisible saborizado
Para perros ≥ 3kg



5MG/KG/DÍA



1/2 COMPRIMIDO MAÑANA Y NOCHE PARA UN PERRO DE 3 KG

En estas condiciones, una caja de 60 comprimidos dura 2 meses.

Soliphen® 60mg

60 mg de fenobarbital en un comprimido doble divisible saborizado**
Para perros ≥ 6kg



5MG/KG/DÍA



1/2 COMPRIMIDO MAÑANA Y NOCHE PARA UN PERRO DE 12 KG

Soliphen® 120mg

120 mg de fenobarbital en un comprimido** doble divisible aromatizado
Para perros ≥ 12kg



5MG/KG/DÍA



1/2 COMPRIMIDO MAÑANA Y NOCHE PARA UN PERRO DE 24 KG

Concentración sérica sérica alcanzada al cabo de 2 semanas



* La dosis de mantenimiento debe ajustarse a cada perro, ya que la dosis necesaria y la concentración terapéutica de bromuro en suero pueden variar de un animal a otro y depende de la naturaleza y gravedad de la enfermedad subyacente. **La administración de dos dosis iguales durante el día con la comida reduce el riesgo de irritación gastrointestinal.

*La dosis requerida diferirá en cierta medida entre individuos y con la naturaleza y gravedad del trastorno. El tratamiento suele administrarse a una dosis inicial de 2,5 mg/kg por la mañana y por la noche (5 mg/kg/día).² **Hígado de cerdo.

GAMA EPILEPSIA DE DÔMES PHARMA, PARA TODAS SUS NECESIDADES DE TRATAMIENTO



Ziapam®

Vetbromide®

Soliphen®



ZIAPAM 5MG
CN: 2983 ESP



VETBROMIDE
600MG
CN: 4019 ESP



SOLIPHEN 15MG
CN: 4054 ESP



SOLIPHEN 60MG
CN: 3244 ESP



SOLIPHEN 120MG
CN: 4055 ESP

Para más información sobre los productos de la gama Epilepsia de Dômes Pharma y los servicios relacionados, póngase en contacto con su delegado de zona o visite www.domespharma.es

REFERENCIAS

1. Junot, S. (2015a). Pharmacologie, indications et contre-indications du diazépam. Le Point Vétérinaire n°357.
2. Devaux, C. et Piazza, S. (2019). Bien nourrir un animal épileptique. Le Point Vétérinaire. N°399, p.8-13.

DÔMES PHARMA IBERIA S.L. EDIFICIO NET-PHARMA CTRA. DE FUENCARRAL, 22, 28108 ALCOBENDAS, MADRID.
TELÉFONO +34 914 250 065 WWW.DOMESPHARMA.ES

DP | DÔMES
PHARMA